



ANTIALERGIKUM, KTERÉ VÁS PODRŽÍ

Xyzal® 7 tablet, Xyzal® 14 tablet. (levocetirizini dihydrochloridum)

Xyzal® je antialergikum, používá se na léčbu onemocnění (příznaků) spojených s alergickou rýmou (včetně perzistující alergické rýmy) a chronickou kopřivkou (chronická idiopatická urtikarie).

Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je 1 tableta denně. Xyzal, potahované tablety, se nedoporučuje podávat dětem mladším než 6 let.

Jestliže se do 3 dnů příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhorší, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Lék je volně prodejný v lékárně. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Lék k vnitřnímu užití. Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci.



UCB s.r.o., Palác Karlín, Thámova 11–13, 186 00 Praha 8
tel.: 221 773 420, fax: 224 829 152
e-mail: info.prague@ucb.com

Xyzal
7 a 14 tablet
levocetirizini dihydrochloridum

Potravinové alergie

Potravinový alergen	Zkříženě reagující potraviny
Burské oříšky	Další luštěniny (sója, zelený hrášek, mouka z vličho bobu, atd.)
Ořechy rostoucí na stromech	Jiné ořechy rostoucí na stromech (para ořechy, liskové oříšky, oříšky kešů, vlašské ořechy, mandle, kokosové ořechy, piniový oříšek)
Krevety	Jiní krabi, humři, škeble, mušle atd.
Pšenice	Ječmen, žito
Losos	Mečoun, mořský jazyk
Kravné mléko	Kozí mléko, hovězí maso
Produkty obsahující latex	Banány, kiwi, avokádo, kaštan, brambora, peckovité ovoce
Travní pyl	Syrové rajské jablčko, pšenice
Březový pyl	Jablko, lískový oříšek, celer, karotka, syrové brambory. Stále vyšší počet potravin je spojen se zkříženou reaktivitou, mezi tyto potraviny patří: avokádo, banán, kaštan, sladká paprika a cizrna
Pyl ambrózie	Vodní meloun, ananasový meloun, kantalup, banán
Pyl černobýlu	Celer, hořčice, koření

Příklady zkříženě reagujících potravinových alergenů, které mohou způsobit potravinami indukované alergické reakce.